




V1

V2

V3



Sint-Maarten

algemeen ziekenhuis
emmaüs

Ajmaline provocatietest

Verpleegeenheid 270 - inwendige

Dagziekenhuis 180

Cathlab - Route 190

Deze brochure is bedoeld om je wegwijs te maken tijdens het verloop van je verblijf in het ziekenhuis en is aanvullend op de informatie van de verpleegkundige of je behandelend geneesheer.

Wat is een ajmaline provocatietest?

De Ajmaline provocatietest is een test ter opsporing van het Brugada syndroom. Het Brugada syndroom is een erfelijke aandoening die een verhoogde kans geeft op plotse dood.

Bij deze test worden er medicijnen, namelijk Ajmaline of natrium-kanaalblokkers, toegediend die de elektrische geleiding van het hart vertragen. Bij personen met het Syndroom van Brugada lokt deze medicatie een typische afwijking op een ECG (elektrocardiogram of hartfilmpje) uit. Op die manier kan de diagnose gesteld worden.

Mogelijke redenen waarom een arts vermoedt dat je het Syndroom van Brugada hebt:

- een verdacht ECG
- familieleden van gekende Brugada patiënten
- onverklaarbaar flauwvallen
- onverklaarbare hartstilstand met geslaagde reanimatie
- plotse dood in de familie

Waar vindt de test plaats?

Voor de test zelf wordt je opgenomen op cathlab of medium care. Op deze eenheden kan je hartritme continu gevolgd worden voor tijdens en na de test.

Hoe bereid je je voor?

Je mag de dag van het onderzoek vanaf middernacht niets meer eten. Een beetje water of thee drinken op de ochtend van het onderzoek is wel toegestaan. Als je medicijnen gebruikt, overleg je met de cardioloog over het wel of niet innemen van de betreffende medicatie. Breng de dag van het onderzoek een lijstje mee met de medicatie die je thuis neemt.

Hoe wordt de test uitgevoerd?

De verpleegkundige op cathlab of medium care kleeft elektroden op je borst en sluit je aan op de monitor en het elektrocardiogramtoestel. Op de monitor is je hartritme te zien en via het elektrocardiogramtoestel kunnen we ECG's maken. Om je arm krijg je een bloeddrukmanchet. Die pompt regelmatig op om je bloeddruk te meten. In je andere arm wordt een infuuscatheter aangebracht waarlangs medicijnen kunnen worden toegediend.

Via het infuus krijg je het medicijn Ajmaline toegediend. Hierbij kan je een warm gevoel in je lichaam ervaren. Je kan ook een vreemde smaak in de mond krijgen en het gevoel ervaren van een dikke tong of lippen. Je kan daarnaast het gevoel krijgen dat je in je broek hebt geplast, maar dit gebeurt niet echt. Al deze gevoelens zijn normaal en ongevaarlijk. Ze verdwijnen bovendien snel.

Indien je het Brugada syndroom hebt, zullen we veranderingen zien op het ECG. Toont de ECG-registratie deze afwijking niet, dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen Brugada syndroom.

Wat na de test?

Indien je negatief test, dus geen Syndroom van Brugada hebt, zal je terug naar de dienst mogen waar je vandaan komt. We zullen hier je hartritme nog even verder opvolgen met behulp van een draagbaar bakje (telemetrie). In sommige gevallen mag je na een half uurtje gewoon naar huis.

Indien je positief test op Brugada zal de cardioloog je op dat moment meer informatie geven over de behandelingsmogelijkheden.

Het is ook aangewezen om je directe familieleden in te lichten zodat die zich ook kunnen laten testen.

Vragen?

Heb je nog vragen over de test? Dan kan je deze stellen aan de verpleegkundige op de eenheid waar je bent opgenomen of aan je behandelend cardioloog.

Verpleegeenheid 270 - inwendige: tel. 015 89 22 70

Dagziekenhuis 180 - tel. 015 89 21 80



AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be

© vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten. In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

vzw Emmaüs - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

B0323 03-07-2025