




In samenspraak met je arts werd er besloten om chemotherapie met **Ramucirumab (Cyramza®)** en **Paclitaxel (Taxol®)** te starten. Op deze infofiche vind je alle informatie betreffende de toedieningswijze en samenstelling van de therapie, het praktisch verloop en (mogelijke) neveneffecten.



Toedieningswijze en samenstelling van de therapie

De therapie wordt volledig via infuus gegeven. Voor aanvang van de behandeling dient er dan ook een poortkatheter geplaatst te worden (zie brochure poortkatheter, volgt via vaatchirurgie).

Werkingsmechanisme

Ramucirumab (Cyramza®): cytostatica (celremmend geneesmiddel)

Paclitaxel (Taxol®): cytostatica (celremmend geneesmiddel)



Praktisch verloop van de therapie

De therapie wordt gegeven in cycli (kuren), één kuur duurt vier weken (28 dagen) en omvat drie opnames voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe vier weken na dag 1.

Voor je behandeling zal je ondersteunende medicatie ontvangen. Deze moet je innemen de avond vóór de chemotherapie-toediening en de ochtend van de chemotherapie-toediening.

Een voorbeeld zie je in het schema hieronder.

Naam product	Dag							
	-1	1	7	8	14	15	16-27	28
Ramucirumab (Cyramza®)		x				x		
Paclitaxel (Taxol®)		x		x		x		
Ondersteunende medicatie:								
Dexamethasone® 10mg Zyrtec® 10mg	20 uur	8 uur	20 uur	8 uur	20 uur	8 uur		20 uur

Voor je therapie start, zal er telkens een bloedafname gebeuren. Soms is uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is niet nodig.

Aantal

Het aantal kuren behandeling zal jouw arts met jou bespreken. Na, gemiddeld twee tot drie maanden, gebeurt een herevaluatie d.m.v. een bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.



Mogelijke nevenwerkingen van de therapie

- Misselijkheid en braken
- Smaak- en geurveranderingen
- Vermoeidheid
- Mondslimvliesontsteking
- Beenmergonderdrukking met tijdelijk verminderde bloedaanmaak als gevolg
 - Verminderd aantal **witte bloedcellen**, waardoor verhoogd infectierisico - bij koorts dient contact genomen te worden.
 - Verminderd aantal **rode bloedcellen**, waardoor meer kans op vermoeidheid/kortademigheid, soms is bloedtransfusie noodzakelijk.
 - Verminderd aantal **bloedplaatjes**, waardoor meer risico op neusbloeding, tandvliesbloeding, blauwe plekken,...

Minder frequente nevenwerkingen

- Buikloop of diarree
- Haarverlies
- Nagelveranderingen
- Ooglast
- Spier- en gewrichtspijn (griepig gevoel)
- Tintelingen of voos gevoel in vingertoppen en/of tenen
- Neusbloedingen

Je arts zal je elke keer bevragen naar eventuele neveneffecten en zo nodig een ondersteunende behandeling voorzien.

Let op:

- Ramucirumab of Paclitaxel kan een allergische reactie veroorzaken. Symptomen hiervan zijn: huiduitslag, lage bloeddruk, koorts, benauwdheid of rillingen, misselijkheid of overmatig zweten. Meld dit meteen aan je arts/verpleegkundige, zodat tijdig ingegrepen kan worden.
- Ramucirumab kan
 - een verhoogde bloeddruk veroorzaken. Je bloeddruk wordt voor en na de toediening van Ramucirumab gecontroleerd. Check ook thuis dagelijks je bloeddruk en polsslag, zodat je arts de evolutie hiervan kan opvolgen.
 - je wondgenezing verstoren. Als je tijdens je chemotherapie een ingreep moet ondergaan, is het belangrijk om dit met je arts te bespreken.
- Dexamthasone® kan bijwerkingen geven, zoals maaglast, slaapmoeilijkheden, stemmingswisselingen of verhoogde eetlust. Het is wel belangrijk om deze medicatie te blijven innemen.

Succes met je behandeling!

Contactgegevens

OPST

Bereikbaar tussen 9 en 12 uur en
tussen 13 en 16 uur
tel. 015 89 21 21
opst.azsintmaarten@emmaus.be

Dageenheid oncologie

Tussen 8 en 18 uur
tel. 015 89 23 50

Arts

Voor vragen aan je arts?
Neem contact op met het medisch
secretariaat - tel. 015 89 21 50

Tijdens het weekend of buiten de kantooruren kan je voor dringende medische vragen steeds terecht op het algemeen nummer - 015 89 10 10 of Spoedgevallen - tel. 015 89 20 90