



Sint-Maarten
algemeen ziekenhuis
emmaüs

Transoesofagale echografie **TEE**

Route 040

Mevrouw, Meneer,

Jouw arts heeft een transoesofagale echografie voorgeschreven (TEE). Dit is een echografie van het hart langs de slokdarm, zodat we je hart meer in detail in beeld kunnen brengen.

Doorgaans wordt hiervoor onder plaatselijke verdoving van de keel een echosonde in de slokdarm ingebracht.

Tijdens het onderzoek kan er gevraagd worden enkele seconden de adem in te houden of een persbeweging uit te voeren.

Dit om de best mogelijke beeldopnames te garanderen, zodat je onderzoek zoveel mogelijk kan bijdragen aan uw diagnose en behandeling.

Voor het onderzoek

- Je moet nuchter zijn: niets meer eten en/of drinken tot minstens zes uur voor het onderzoek.
- Draag je een gebitsprothese? Doe deze net voor het onderzoek uit.
- Je keel wordt verdoofd door middel van een spray met een lokaal verdovingsmiddel. De keel zal dan gezwolle aanvoelen. Voor het onderzoek wordt gevraagd of je eventueel allergisch bent voor lokale verdovingsmiddelen.
- Je krijgt een infuus in de linkerarm voor het eventueel toedienen van contrastvloeistof. Hierbij is er geen risico op allergische reacties, het gaat niet om contraststof die gebruikt wordt bij radiologische onderzoeken.
- Er worden elektroden op je borst geplaatst om je elektrocardiogram te volgen.
- Je legt je op je linkerzij op de onderzoekstafel.

Tijdens het onderzoek

- Aan de tip van de echosonde wordt een glijmiddel aangebracht.
- Je krijgt een mondstuk tussen de tanden. Hierlangs wordt de sonde ingebracht, waarna de arts je zal vragen een slikbeweging te maken. Op die manier schuift de sonde door de keel in de slokdarm en kunnen de metingen en opnames starten.
- Je concentreert je zoveel mogelijk op je ademhaling. Vermijd slikken om het onderzoek sneller af te ronden. Je luchtweg wordt niet gehinderd door de echosonde, je kan dus steeds vrij ademen.
- De arts zal je op bepaalde momenten vragen even de adem in te houden of een persbeweging te maken.
- Het onderzoek duurt maximaal 15 minuten.

Na het onderzoek

- De elektroden en het infuus worden verwijderd.
- Een uur na het onderzoek mag je eten en drinken, en je medicatie innemen.
- Het resultaat wordt onmiddellijk met jou besproken door de uitvoerende arts.
- Je huisarts en verwijzende cardioloog ontvangen dezelfde dag een verslag van het onderzoek.
- In uitzonderlijke gevallen wordt een sedatiemiddel (Midazolam) toegediend om je te ontspannen (geen volledige narcose). In dat geval dien je mogelijk wat langer in het ziekenhuis te blijven en kan je dezelfde dag geen voertuig besturen. Laat je voor en na het onderzoek door iemand begeleiden.
Dit sedatiemiddel kan ook een invloed hebben op de kwaliteit van het onderzoek, aangezien er voor optimale beeldkwaliteit soms specifieke opdrachten noodzakelijk zijn, zoals ademhaling en persen.

Contact

Secretariaat cardiologie: 015 89 10 10



AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be

© vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten

Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de directie van AZ Sint-Maarten. In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

vzw Emmaüs - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen
RPR Antwerpen-Mechelen - BE 0411.515.075

NB119 10-07-2023