



Sint-Maarten
algemeen ziekenhuis
emmaüs



ANTIBIOTICA-ALLERGIE LABEL

Anamnese

Nazicht dossier

Geen allergie

Geen restricties.
Pas allergie status aan.

(Verdenking van) allergie

Onmiddellijke reacties

Minuten - uren

Ernstig

Veralgemeende urticaria,
hypotensie, kortademigheid,
angio-oedeem

Mild

Geïsoleerde urticaria of
urticaria met milde zwelling,
maar zonder anafylaxie

Uitgestelde reacties

> 24 uur

Ernstig

Ernstige reactie met pustels,
blaren, huidloslating, en ev.
algemene verschijnselen

Mild

Jeukende, klein- tot
grootvlekkige huidaitslag

≤ 5 jaar geleden

> 5 jaar geleden

≤ 1 jaar geleden

>1 jaar geleden

ALLERGISCH VOOR

penicilline

- Vermijd alle penicillines.
- Vermijd cefalosporines met vergelijkbare zijketen.
- Andere B-lactam antibiotica (incl. andere cefalosporines): toediening onder toezicht.

cefalosporine

- Vermijd het cefalosporine zelf en penicillines/cefalosporines/monobactams met vergelijkbare zijketen.
- Andere B-lactam antibiotica: toediening onder toezicht.

non B-lactam

- Vermijd het middel zelf en alle antibiotica uit dezelfde klasse

- Penicillines en cefalosporines met vergelijkbare zijketen: toediening onder toezicht.
- Andere B-lactam antibiotica (incl. andere cefalosporines) kunnen gegeven worden.

- Penicillines/cefalosporines/monobactams met vergelijkbare zijketen: toediening onder toezicht. (uitz: vermijd aztreonam bij ceftazidime allergie)
- Andere B-lactam antibiotica kunnen gegeven worden.

- Alle antibiotica van dezelfde klasse kunnen gegeven worden onder toezicht (m.u.v. veralgemeende urticaria op quinolones).

- Vermijd alle B-lactam antibiotica.

- Vermijd alle B-lactam antibiotica.

- Vermijd het middel zelf en alle antibiotica uit dezelfde klasse.

- Vermijd alle penicillines.
- Vermijd cefalosporines met vergelijkbare zijketen (tenzij van vitaal belang)
- Andere B-lactam antibiotica (incl. andere cefalosporines) kunnen gegeven worden.

- Vermijd het cefalosporine zelf en penicillines/cefalosporines/monobactams met vergelijkbare zijketen.
- Andere B-lactam antibiotica kunnen gegeven worden.

- Alle antibiotica van dezelfde klasse kunnen gegeven worden met patiëntinstructies en follow-up.

- Alle B-lactam antibiotica kunnen gegeven worden.

- Alle B-lactam antibiotica kunnen gegeven worden.

- Alle antibiotica van dezelfde klasse kunnen gegeven worden met patiëntinstructies en follow-up.